

# Fledermausliteratur aus Rheinland-Pfalz

Jahrgang 12

16. April 2001

## In dieser Ausgabe:

Vorwort	1
Literaturverzeichnis	1
Impressum	11

## Vorwort

Mittlerweile existiert schon eine beträchtliche Anzahl von Publikationen zur Fledermausfauna von Rheinland-Pfalz.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenstellung von

Veröffentlichungen seit 1844.

Die Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dennoch sind wir dankbar, wenn Sie uns fehlende Literaturanga-

ben sowie Neuerscheinungen zukommen lassen.

Es ist geplant, die Liste in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren.

## Literaturverzeichnis

ADAM, N. (1986): Über das Vorkommen einheimischer Fledermausarten an ausgewählten Winterquartieren im oberen Fischbachtal. - Facharbeit am Gymnasium Idar-Oberstein, 30 S.

ARBEITSKREIS FLEDERMAUSSCHUTZ RHEINLAND-PFALZ (1992): Rote Liste der bestandsgefährdeten Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) in Rheinland-Pfalz - Vorschlag einer Neufassung. - Fauna Flora Rheinland-Pfalz 6:1051-1063; Landau.

BASTIAN, J. & U. BASTIAN (1991): Winter 88/89: Langohr überwintert im Freien. - Flattermann 6:5; Karlsruhe.

BECKER, H.-K. (1925): Der Karst von Stromberg und seine Höhlen. - Rheinische Heimatblätter 1925 (10):313-317; ebenso: Kreuznacher Heimatblätter 1925 (9 & 10).

BEHSE, K. (1992): Ökologische Beobachtungen in dem Fledermauswinterquartier Fischbacher Kupferbergwerk. - Facharbeit am Gymnasium Idar-Oberstein: 24 S. + 50 S. Anhang



Erschienen als Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 21, 1996

16 Autoren, überwiegend Mitarbeiter des verbandsübergreifenden Arbeitskreises Fledermausschutz Rheinland-Pfalz, legten erstmals für Rheinland-Pfalz einen thematisch geschlossenen Band mit Materialien zum Fledermausschutz in Rheinland-Pfalz vor.

GNOR-Eigenverlag, ISSN 0938-7684

- BILO, M. (1987): Öko-ethologische Untersuchungen in einer Wochenstube von *Myotis myotis* (BORKH. 1797). - Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der 1. Staatsprüfung für Lehrämter, Köln, 162 S.
- BILO, M. (1989): Artenschutzprojekt Fledermäuse in Rheinland-Pfalz: Erfassung thermophiler Fledermausarten im Saargau, Reg.-Bez.. Trier. - Unveröffentl. Bericht für das LfUG, 42 S.
- BILO, M. (1989): Aktivitäten der Mausohrfledermaus in einer Wochenstube: Grundlage für die Erhaltung und Neuschaffung ihrer Sommerquartiere. - *Dendrocopos* **16**:5-13; Trier-Saarburg.
- BILO, M. (1989): Raumkonkurrenz bei Schleiereulen (*Tyto alba*) und Mausohrfledermaus (*Myotis myotis*). - *Dendrocopos* **16**:14-16; Trier-Saarburg.
- BILO, M., HARBUSCH, C. & M. WEISHAAR (1989): Sommerliche Fledermausaktivitäten an Höhlen und Stollen. - *Dendrocopos* **16**:17-24; Trier-Saarburg.
- BILO, M., HAUSEN, M., SCHMIDT, R. & A. STEINKAMP (1990): Bedeutende Fledermausvorkommen im Sommer in künstlichen Stollen an der Obermosel. - *Dendrocopos* **17**:28-36; Trier-Saarburg.
- BILO, M., HAUSEN, M., SCHMIDT, R. & A. STEINKAMP (1991): A regional bat-mapping: suggestion to include schools in work on nature conservation. - *Myotis* **29**:75-82; Bonn.
- BORCHERDING, F. (1890): Vier Wochen in Nassau an der Lahn.- Nachrichtenblatt der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft **22**:65-81; Frankfurt a.M.
- BOYE, P., DIETZ, M. & M. WEBER (1999): Fledermäuse und Fledermausschutz in Deutschland.- 110 S; Bonn-Bad Godesberg .
- BRAUN, A. (1986): Ein Beitrag zur ökologischen Funktion der Westwall-Bunkerruinen. - Mitt. bad. Landesverein Naturk. u. Natursch. (N.F.) **14**:207-229.
- BRAUN, M. (1982): Zum Vorkommen von Fledermäusen im Naturpark Nassau; Winter 1980/81. - Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz **3** (1981):94; Landau.
- BRAUN, M. (1983): Fledermauserfassung im nördlichen Rheinland-Pfalz; Winter 1981/82. - Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz **4** (1982):40-41; Landau.
- BRAUN, M. (1984): Fledermauserfassung im nördlichen Rheinland-Pfalz; Winter 1982/83. - Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz **5** (1982/83):42-44; Landau.
- BRAUN, M. & U. BRAUN (o. Jahr): Fledermäuse - Nächtlich fliegende Säugetiere" – Nassau.
- BRAUN, M. & U. BRAUN (1994): Die Fauna in ehemaligen Bergwerksstollen im Rhein-Lahn-Kreis.- In: Kreisverwaltung Rhein-Lahn (Hrsg.): Bergbau im Rhein-Lahn-Kreis: 88-91; Bad Ems.
- BRAUN, M., SIMON, L. & G. WAGNER (1983): Zwei bemerkenswerte Fledermausfunde (Chiroptera: *Rhinolophus hipposideros* und *Vespertilio murinus*) in Rheinland-Pfalz. - Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz **2**(4):773-775; Landau.
- CASTOR, T., DETTMER, K. & S. JÜPTNER (1993): Vom Tagesmenü zum Gesamtfraßspektrum des Grauen Langohrs (*Plecotus austriacus*) - 2 Jahre Freilandarbeit für den Fledermausschutz. - *Nyctalus* (N.F.) **4**(5): 495-538; Berlin.
- DIEDERICH, J. (1986): Fund einer beringten Fledermaus. - *Regulus* **3**:67.
- ENGLÄNDER, H. & G. JOHNEN (1971): Untersuchungen in einem rheinischen Fledermauswinterquartier. - *Decheniana-Beiheft* **18**:99-108; Bonn.
- ENGLÄNDER, H. (1960): Untersuchungen an rheinischen Fledermauspopulationen. - Bonn. zool. Beitr. Sonderheft **11**:204-209; Bonn.
- FAHL, G. (1996): Erster Nachweis einer im Winterquartier schlafenden Teichfledermaus (*Myotis dasycneme*) im Westerwald.- Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **20**, Jahresbericht Koblenz 1995: 189. Landau.
- FELTEN, H. (1953): Beobachtungen an winterschlafenden Fledermäusen im Rhein-Main-Gebiet. - Säugetierkd. Mitt. **1**:8-13; München.
- FELTEN, H. (1971): Fledermaus-Beringung im weiteren Rhein-Main-Gebiet 1959/60 -1969/70. - *Decheniana Beiheft* **18**:83-93; Bonn.
- FELTEN, H. (1978): Fledermausbeobachtungen in Gebieten des südlichen West-Deutschland 1945-1979. - *Myotis* **16**:3-82; Bonn.
- FELTEN, H. & K. KLEMMER (1960): Fledermaus-Beringung im Rhein-Main-Lahn-Gebiet 1950 - 1959. - Bonn. zool. Beitr. **11** Sonderheft:166-188; Bonn.
- FELTEN, H. & D. KOCK (1979): Fledermausbeobachtungen in Gebieten des südlichen Westdeutschlands 1945-1979.- *Myotis* **16**:3-82; Bonn.
- FÖLLING, A., KIEFER, A. & R. REIFENRATH (1996): Untersuchungen zur Bedeutung von Burgen, Burgruinen und Schlössern im Regierungsbezirk Koblenz als Fledermausquartiere – erste Ergebnisse.- In: KIEFER, A. & M. VEITH (Hrsg.): Beiträge zum Fledermausschutz in Rheinland-Pfalz. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **21**: 119-132; Landau.
- FÖLLING, A. & R. REIFENRATH (2000): Weitere Nachweise der Zweifarbfledermaus, *Vespertilio murinus* (LINNAEUS, 1758), aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Kanton St. Gallen (Schweiz).- *Nyctalus* **7**(4): 452-453; Berlin.
- FÖLLING, A., REIFENRATH, R. & A. ROHNER (1999): Fledermäuse und Spinnen auf Burg Rheinfels (Rheinland-Pfalz, Rhein-Hunsrück-Kreis).- Mitteilungen des Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher e. V. **45**(2): 76-79; München.
- FUHRMANN, M. (1989): Artenschutzprojekt Fledermäuse (Chiroptera) in Rheinland-Pfalz: Schwerpunktprogramm (1.4.2): Fledermausarten der Rheinaue. - Unveröffentl. Endbericht für das LfUG Oppenheim, 132 S.
- FUHRMANN, M. (1991): Faunistische Kartierung im Rahmen der UVP: "Sanierung, Erweiterung und Erhöhung der Hausmülldeponie II Rennerod - Westerwaldkreis".- Unveröffentl. Gutachten im Auftrag von: L.A. U.B. GmbH; Mainz.
- FUHRMANN, M. (1991): Untersuchungen zur Biologie des Braunen Langohrs (*Plecotus auritus* L., 1758) im Lennebergwald bei Mainz. - Diplomarbeit, Inst. Zoologie, Uni Mainz, 126 S.

- FUHRMANN, M. (1992): Artenschutzprojekt Fledermäuse (Chiroptera) in Rheinland-Pfalz (Fortführung): Schwerpunktprogramm (1.1): Fledermausarten der Rheinauen.- Unveröffentl. Bericht für das LfUG Oppenheim, 83 S.
- FUHRMANN, M. (1992): Artenschutzprojekt Fledermäuse (Chiroptera) in Rheinland-Pfalz (Fortführung): Schwerpunktprogramm (1.3): Autobahnbrücken als Fledermausquartiere. - Unveröffentl. Bericht an das LfUG Oppenheim, 52 S.
- FUHRMANN, M. (1993): Untersuchung zum Vorkommen sowie Quartier- und Jagdgebietsansprüche bei der Fledermausart Braunes Langohr (*Plecotus auritus* L.; 1758) im Lennebergwald. - Unveröffentl. Bericht für das Forstamt Alzey, 52 S.
- FUHRMANN, M. (1995): Bewertung weiterer Maßnahmen zum gegenwärtigen Sachstand der geplanten Ortsumgehung B 257 Hönningen/Ahr bezüglich des dortigen Fledermausvorkommens im "Alten Bahnhof". - Unveröffentl. Bericht für das SBA Cochem, 25 S.
- FUHRMANN, M. & A. SEITZ (1992): Nocturnal activity of the brown long-eared bat (*Plecotus auritus* L. 1758): data from radiotracking in the Lenneberg forest near Mainz (Germany). - In: PRIEDE, I.G. & S.M. SWIFT (Hrsg.), Wildlife telemetry. New York (Ellis Horwood).
- FUHRMANN, M. & O.GODMANN (1994): Baumhöhlenquartiere vom Braunen Langohr und von der Bechsteinfledermaus: Ergebnisse einer telemetrischen Untersuchung.- in: ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR FLEDERMAUSSCHUTZ IN HESSEN (Hrsg.): Die Fledermäuse Hessens. Geschichte, Vorkommen, Bestand und Schutz: 181-186. Verlag Manfred Hennecke. Remshalden-Buoch.
- FUHRMANN, M. & A. KIEFER (1991): Zwischenbericht zum Projekt "Untersuchungen zum Ausflugsverhalten von *Myotis myotis* (BORKHAUSEN, 1797) in Hönningen/Ahr". Unveröffentl. Bericht zur Voruntersuchung 1991 im Auftrag der Firma Kocks Consult GmbH Koblenz für das Straßenbauamt Cochem. 29 S.
- FUHRMANN, M. & A. KIEFER (1992): Untersuchungen zum Flugverhalten von Mausohren (*Myotis myotis* BORKHAUSEN, 1797) aus dem alten Bahnhof von Hönningen/Ahr. - Unveröffentl. Gutachten im Auftrag der Firma Kocks Consult GmbH Koblenz für das Straßenbauamt Cochem. 30 S.
- FUHRMANN, M. & A. KIEFER (1996): Fledermausschutz bei einer Straßeneubauplanung: Ergebnisse einer zweijährigen Untersuchung an einem Wochenstubenquartier von Großen Mausohren (*Myotis myotis* BORKHAUSEN, 1797).- In: KIEFER, A. & M. VEITH (Hrsg.): Beiträge zum Fledermausschutz in Rheinland-Pfalz. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 21: 133-140; Landau.
- FUßER, A. (1987/88): Westwallserie. - Pirmasenser Rundschau 26.8., 16.9., 28.9., 5.10., 12.10., 15.10., 22.10., 29.10., 30.10., 28.11.1987, 4.1., 5.1., 7.1.1988.
- FUßER, A. (1988): Winterquartiere der Fledermäuse in Westwallstollen gefährdet. - Die Rheinpfalz 295 (20.12.88).
- GASCHOTT, O. (1921): Die Mopsfledermaus (*Synotis barbastellus* SCHREB.) in der Pfalz. - Pfälzisches Museum 38:154.
- GEIB, K. (1909-13): Beiträge zur Geologie von Stromberg und Umgebung. - Führer in die Natur der Umgebung Strombergs 2.
- GEISENHEYNER, L. (1891): Wirbeltierfauna von Kreuznach unter Berücksichtigung des ganzen Nahegebietes, II. Teil: Säugetiere. - Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Kgl. Gymnasiums zu Kreuznach, Nr. 443, 49 S.; Bad Kreuznach.
- GEISENHEYNER, L., WESSER, F. & C. SCHMITZ (1891): Der Kreis Kreuznach. Heimatstunde für Schule und Haus.- Schmithals Verlag, 117 S.; Bad Kreuznach.
- GEORG, H. (1986): In ehemaligen Bergwerksstollen überwinternde Fledermäuse des Rheinischen Schiefergebirges: Bestandsentwicklung und deren mögliche Ursachen. - Dt. Ges. f. Säugetierk., 60. Hauptvers., Kurzf. d. Vorträge u. Posterdemonstrationen, Paul Parey Verlag.
- GEORG, H. (1986): Zur Hangplatzwahlpräferenz bei in Stollen überwinternden Fledermäusen (Chiroptera). - Dt. Ges. f. Säugetierk., 60. Hauptvers., Kurzf. d. Vorträge u. Posterdemonstrationen.
- GREUELSBERGER, W. (1983): Fledermausschutzaktion des DBV im Kreis
- Ahrweiler. - DBV-Jahresbericht 1983 Gruppe Ahrtal:37-40.
- GRIMM, F., KÖNIG, H., SEILER, L. & H. WISSING (1998): Fledermauserfassung in pfälzischen Burgen und Ruinen.- Unveröffentl. Bericht für das LfUG Rheinland-Pfalz, 29 S; Weyher.
- GRÜNWARD, A. & G. PREUSS (1983): Säugetiere in Rheinland-Pfalz: Verzeichnis der wildlebenden Säugetiere, einschließlich der verschollenen und ausgestorbenen Arten (Vertebrata: Mammalia). - Beiträge Landespflege Rheinland-Pfalz: 66-91, Oppenheim.
- GÜNTHER, H. & M. NIEHUIS (1981): (Heteroptera: Cimicidae) - *Cimex lectularius* L. Freilandfunde in der Pfalz. - Pfälzer Heimat 32(2):86; Speyer.
- HARBUSCH, C. (1997): Das LIFE-Projekt „Grenzüberschreitendes Programm zum Schutz der Fledermäuse im westlichen Mitteleuropa“.- Dendrocopos 24: 177-179; Trier-Saarburg.
- HARBUSCH, C. & M. WEISHAAR (1987): Wiederfund der Hufeisennase (*Rhinolophus ferrumequinum*) im Saarland. - Dendrocopos 14:15-17; Trier-Saarburg.
- HAUSEN, M. & A. STEINKAMP (1990): Die Fledermäuse im Konzer Raum untersucht anhand von zwei Sommerkartierungsperioden an ausgewählten Stollen.- Unveröffentl. Jugend forscht-Arbeit, 17 S.; Konz.
- HEYNE, K.-H. (1981): Die Verbreitung von Fledermäusen im Bezirk Trier aufgrund einer Kontrolle der Stollen im Winter 1980/81. - Dendrocopos 8: 54-57; Trier-Saarburg.
- HEYNE, K.-H. (1983): Die Winterverbreitung von Fledermäusen in Felsstollen im Regierungsbezirk Trier: Ergebnisse einer dreijährigen Kartierung. - Dendrocopos 10 :46-50; Trier-Saarburg.
- HEYNE, K.-H. & R. SCHEUER (1982): Fledermausbericht 1981/82. - Dendrocopos 9:48-49; Trier-Saarburg.
- HÖFELS, R. (1968): Aus dem Leben der Fledermäuse. - Heimat-Jahrb. Landkreis Bingen 12: 121-124; Bingen.
- HOFFMANN, D. (1990): Lebensweise und Schutz der Fledermäuse in

- Rheinland-Pfalz. - Facharbeit am Erich Klausener Gymnasium Adenau, 36 S.
- HOPSTÄTTER, H. (1950): Im Karst von Stromberg.- Heimatkalender 1950:24-30.
- HUTTERER, R. & W. VON KOENIGSWALD (1993): Knochenfunde aus einer Karsthöhle bei Berndorf in der Hillesheimer Kalkmulde (Eifel). - Mainzer naturw. Archiv **31**:223-238; Mainz.
- ISSEL, W. (1938): *Rhinolophus ferrum-equinum* (SCHREBER) im Rheinland. - Decheniana **97**:19-20; Bonn.
- ISSEL, W. (1950): Ökologische Untersuchungen an der Kleinen Hufeisen-nase (*Rhinolophus hipposideros* (BECHSTEIN)) im mittleren Rheinland und unteren Altmühltal. - Zool. Jb., Syst. **79** (1/2):71-86.
- ISSEL, W. (1975): Die Fledermäuse des unteren Wiedtales nach Untersuchungsergebnissen der Jahre 1973 bis 1949.- Rheinische Heimatpflege **12** (N.F.):188-195.
- JAKOBS, B. (1976): Aus der Tierwelt des Trierer Raumes; Vögel, Säugtiere, Lurche und Kriechtiere. - Bernhard und Marlene Jakobs, Selbstverlag, Trier, 106 S.
- JÜPTNER, S. & K. DETTMER (1989): Fledermauskartierung Münstermaifeld. - Facharbeit am Gymn. Kurfürst Balduin Münstermaifeld, "Schüler experimentieren", 47 S.
- JÜPTNER, S., DETTMER, K & T. CASTOR (1991): Vom Tagesmenü zum Gesamtfraßspektrum von *P. austriacus*. - 2 Jahre Freilandarbeit für den Fledermausschutz. - Unveröffentl. Arbeit am Gymn. Münstermaifeld im Wettbewerb Jugend forscht, 74 S.
- KETTERING, K. (?): Fledermausquartiere in der Pfalz.- Wiss. Prüfungsarbeit an der Universität Koblenz-Landau; 111 S.; Landau.
- KIEFER, A. (1990): Erstnachweis der Zweifarbfledermaus (*Vespertilio discolor* NATTERER IN KUHLE, 1817) für den Regierungsbezirk Trier. - Dendrocopos **17**: 7-10; Trier-Saarburg.
- KIEFER, A. (1992): Ein partiell-albinotisches Braunes Langohr (*Plecotus auritus* (LINNAEUS, 1758)) aus dem Idarwald (Rheinland-Pfalz). - Fauna Rheinland-Pfalz **6** (4):1169-1171; Landau.
- KIEFER, A. (1992): Zwei weitere Nachweise der Zweifarbfledermaus (*Vespertilio discolor* NATTERER IN KUHLE 1817) in Rheinland-Pfalz. - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz **6**(4): 903-912; Landau.
- KIEFER, A. (1992): Artenschutzprojekt Fledermäuse Rheinland-Pfalz: Erfassung von *Myotis myotis* an der Mosel - ein Methodenvergleich. Teilprojekt: Erfassung von *Myotis myotis* durch Kirchenkontrollen in den Kreisen Cochem-Zell und Mayen-Koblenz. - Unveröffentl. Bericht für das LfUG. 21 S.
- KIEFER, A. (1993): Ausflugbeobachtungen an einer Kolonie von *Myotis myotis* in Dienheim. - Unveröffentl. Bericht zur Voruntersuchung 1993 im Auftrag der Faunistisch-ökologischen Arbeitsgemeinschaft, Trier; durchgeführt durch die Biodata GmbH Mainz. 11 S.
- KIEFER, A. (1993): Ausflugbeobachtungen an einer Kolonie von *Myotis myotis* in Dienheim. - Unveröffentl. Bericht zur Hauptuntersuchung 1993 im Auftrag der Faunistisch-ökologischen Arbeitsgemeinschaft, Trier; durchgeführt durch die Biodata GmbH Mainz. 14 S.
- KIEFER, A. (1995): Fledermauskartierung auf dem Flugplatz Sembach. - Faunistischer Fachbeitrag im Rahmen der landespflegerischen Bestandsaufnahme, Unveröffentl. Gutachten für die L.A.U.B. Kaiserslautern, 8S.
- KIEFER, A. (1996): Frostschäden an den Ohren und andere Verletzungen bei Fledermäusen (Mammalia, Chiroptera) aus dem Regierungsbezirk Koblenz (BRD, Rheinland-Pfalz).- In: KIEFER, A. & M. VEITH (Hrsg.): Beiträge zum Fledermausschutz in Rheinland-Pfalz. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **21**: 77-86; Landau.
- KIEFER, A. (1996): Große Abendsegler (*Nyctalus noctula*) durch Bienen getötet.- In: KIEFER, A. & M. VEITH (Hrsg.): Beiträge zum Fledermausschutz in Rheinland-Pfalz. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **21**: 174; Landau.
- KIEFER, A. (1996): Untersuchungen zu Raumbedarf und Interaktionen von Populationen des Grauen Langohrs (*Plecotus austriacus* FISCHER, 1829) im Naheland.- Unveröffentl. Diplomarbeit am Lehrstuhl für Ökologie (Prof. DR. A. SEITZ), Institut für Zoologie, Uni Mainz, 116 S. + 28 S. Anhang.
- KIEFER, A. (1998): Fledermäuse.- ForstInfo **11**(4): 5-7.
- KIEFER, A. & M. FUHRMANN (1993): Untersuchungen zum Flugverhalten von Mausohren (*Myotis myotis*, BORKHAUSEN 1797) einer Wochenstube im Rahmen eines Straßenbauprojektes. - Z. f. Säugetierkunde Sonderheft **58**:33-34.
- KIEFER, A. & U. SANDER (1991): Faunistisches Sondergutachten zur UVP B 256 Umgehung Rengsdorf. Gefährdungen von Chiropteren durch den Straßenbau. - Unveröffentl. Gutachten im Auftrag des Instituts für Planungsdaten, Offenbach, Bonn/Mainz, 20 S.
- KIEFER, A. & U. SANDER (1993): Auswirkungen von Straßenausbau und Verkehr auf Fledermäuse. Naturschutz und Landschaftsplanung **25** (6):211-216; Stuttgart.
- KIEFER, A. & C. SCHREIBER (1992): Ungewöhnlicher Fund einer toten Fledermaus im Historischen Kupferbergwerk Fischbach. - Mitteilungen des Vereins für Heimatkunde im Landkreis Birkenfeld **66**:177-182; Birkenfeld.
- KIEFER, A. & M. VEITH (1989): Artenschutzprojekt Fledermäuse Rheinland-Pfalz: Vorkommen und Status der Großen Hufeisennase (*Rhinolophus ferrumequinum*) im Regierungsbezirk Koblenz und den angrenzenden Gebieten. - Unveröffentl. Bericht für das LfUG Oppenheim, 22 S.
- KIEFER, A. & M. VEITH (1994): Telemetrische Untersuchungen zur räumlichen Struktur des Sommerlebensraumes von Grauen Langohren (*Plecotus austriacus*). - Unveröffentl. Abschlußbericht der Voruntersuchungen 1993 und 1994 für das Umweltzentrum der Universität Mainz, 29 S.
- KIEFER, A. & M. VEITH (1998): Untersuchungen zu Raumbedarf und Interaktion von Populationen des Grauen Langohrs, *Plecotus austriacus* (FISCHER, 1829), im Nahegebiet – Vortrag.- Autorreferat in: *Nyctalus* (N. F.) **6**(5): 531; Berlin.

- Bad Dürkheim.
- KIEFER, A. & M. VEITH (1998): Saisonale thermoregulatorische Hangplatzwahl in einem Sommer- und Winterquartier beim Grauen Langohr, *Plecotus austriacus* (FISCHER, 1829) (Chiroptera, Vespertilionidae) – Posterbeitrag.- Autorreferat in: *Nyctalus* (N.F.) **6**(5): 532; Berlin
- KIEFER, A. & M. WEISHAAR (1999): Zur Geschichte der Fledermausforschung in Rheinland-Pfalz.- *Flattermann* **22**: 2-5; Karlsruhe.
- KIEFER, A., SCHREIBER, C. & M. VEITH (1994): Netzfänge in einem unterirdischen Fledermausquartier in der Eifel (BRD, Rheinland-Pfalz) - Phänologie, Populationsschätzung, Verhalten. - *Nyctalus* (N.F.) **5**(3/4): 302-318; Berlin.
- KIEFER, A., SCHREIBER, C. & M. VEITH (1996): Felsüberwinternde Fledermäuse (Mammalia, Chiroptera) im Regierungsbezirk Koblenz (BRD, Rheinland-Pfalz) – Vergleich zweier Kartierungsperioden.- In: KIEFER, A. & M. VEITH (Hrsg.): Beiträge zum Fledermausschutz in Rheinland-Pfalz. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **21**: 5-34; Landau.
- KIEFER, A., MERZ, H., RACKOW, W., ROER, H. & D. SCHLEGEL (1994): Bats as traffic casualties in Germany. - *Myotis* **32**:215-220; Bonn.
- KIEFER, A., VEITH, M. & M. WEISHAAR (1996): Vorläufige Zusammenstellung der Fledermausliteratur Rheinland-Pfalz.- In: KIEFER, A. & M. VEITH (Hrsg.): Beiträge zum Fledermausschutz in Rheinland-Pfalz. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **21**: 175-186; Landau.
- KLENK, R., SCHMIDT, W. & A. KIEFER (1996): Telemetrie zweier Wasserfledermäuse (*Myotis daubentoni* KUHL, 1819) im Rhein-Lahn-Kreis.- In: KIEFER, A. & M. VEITH (Hrsg.): Beiträge zum Fledermausschutz in Rheinland-Pfalz. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **21**: 87-94; Landau.
- KOCH, K. (1863): Das Wesentliche der Chiropteren mit besonderer Beschreibung der in dem Herzogthum Nassau und den angränzenden Landestheilen vorkommenden Fledermäuse. - *Ver. Naturk. Herzogthum Nassau, Wiesb., 17/18*:261-593; Wiesbaden.
- KOCH, K. (1866): Die Chiropteren-Fauna des Pollichiagebietes. - *22.-24. Jahresber. der Pollichia*:323-347;
- KÖNIG, C. (1961): Schleiereule, *Tyto a. alba* SCOP., "schlägt" fliegende Fledermäuse. - Beiträge z. Vogelkunde **7**(3/4):229-233; Berlin.
- KÖNIG, C. & A. EPPLE (1957): Die Wimperfledermaus, *Myotis emarginatus* (GEOFFROY, 1806) auch in der Pfalz.- Säugetierkundliche Mitteilungen **5**: 123-124; München.
- KÖNIG, H. (1991): Winternachweis der Nordfledermaus (*Eptesicus nilssonii*) in der Pfalz (Mammalia, Chiroptera). - *Fauna Flora Rheinland-Pfalz* **6**(3):869-873; Landau.
- KÖNIG, H. (1991): Kleiner Abendsegler (*Nyctalus leisleri*) als Stacheldrahtopfer (Mammalia: Chiroptera). - *Fauna Flora Rheinland-Pfalz* **6**(2): 581-583; Landau.
- KÖNIG, H. (1996): Zwergfledermaus (*Pipistrellus pipistrellus* SCHREBER, 1774) mit Hautgeschwüren.- In: KIEFER, A. & M. VEITH (Hrsg.): Beiträge zum Fledermausschutz in Rheinland-Pfalz. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **21**: 173; Landau.
- KÖNIG, H. & M. DIEMER (1993): Fünf Jahre Fledermaus-Winterkontrolle in der Nordpfalz (Mammalia: Chiroptera). - *Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz* **7**(1):81-93; Landau.
- KÖNIG, H., GRIMM, F., SEILER, L. & H. WISSING (2001): Ergebnisse der Fledermauserfassungen (Winter 1996/97-2000/01) im südlichen Rheinhessen und in der Pfalz (Bundesrepublik Deutschland; Rheinland-Pfalz); *Fauna Flora Rheinland-Pfalz* **9**(3): 971-983; Landau.
- KÖNIG, H. & W. KÖNIG (1995): Ergebnisse einer Untersuchung nistkastenbewohnender Fledermäuse in der Nordpfalz.- *Nyctalus* (N.F.) **5**(6) :529-544 ; Berlin.
- KÖNIG, H. & W. KÖNIG (1999): Zum Vorkommen des Großen Mausohrs (*Myotis myotis* BORKHAUSEN, 1797) in Nistkästen der Nordpfalz (Rheinland-Pfalz, Bundesrepublik Deutschland).- *Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz* **9**(1): 113-120; Landau
- KÖNIG, H. & H. MAUS (2000): Fledermausgerechte Mauerwerkinstandsetzung am Beispiel der Hardenburg bei Bad Dürkheim (Bundesrepublik Deutschland, Rheinland-Pfalz).- *Nyctalus* (N.F.) **7**(4): 360-372 ; Berlin.
- KÖNIG, H. & F. NEUMANN (1996): Drahtgitter zur Taubenabwehr als Fledermausfallen.- In: KIEFER, A. & M. VEITH (Hrsg.): Beiträge zum Fledermausschutz in Rheinland-Pfalz. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **21**: 141-144; Landau.
- KÖNIG, H. & H. WISSING (1996): Netzfänge zur Fledermauserfassung in der Pfalz (BRD, Rheinland-Pfalz).- In: KIEFER, A. & M. VEITH (Hrsg.): Beiträge zum Fledermausschutz in Rheinland-Pfalz. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **21**: 35-40; Landau.
- KÖNIG, H. & H. WISSING (1996): Wiederentdeckung der Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus* SCHREBER, 1774) in der Pfalz (BRD, Rheinland-Pfalz).- In: KIEFER, A. & M. VEITH (Hrsg.): Beiträge zum Fledermausschutz in Rheinland-Pfalz. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **21**: 41-44; Landau.
- KÖNIG, H. & H. WISSING (2000): Waldbewohnende Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) in der Pfalz (BRD, Rheinland-Pfalz).- *Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz* **9**(2): 557-582; Landau.
- KÖNIG, H. & H. WISSING (2001): Fortpflanzungsnachweis der Nordfledermaus (*Eptesicus nilssonii* KEYSERLING & BLASIUS, 1839) in der Pfalz (BRD, Rheinland-Pfalz) mit Anmerkungen zur aktuellen Verbreitung der Art im Untersuchungsgebiet.- *Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz* **9**(3): 985-993; Landau.
- KRUMME, S. & M. KRUMME (1990): Polizeischutz für Fledermäuse; Haben Behörden Narrenfreiheit? - Dokumentation der Kreisgruppe Koblenz vom Bund für Umwelt u. Naturschutz Deutschland (BUND): 1-59.
- KUNZ, M. (1993): Faunistische Beobachtungen aus dem Bereich des Regierungsbezirkes Koblenz - Beobachtungen 1992. - *Fauna Flora Rheinland-Pfalz, Beiheft* **10**:124-143; Landau.
- LAUFENS, G. (1973): Beiträge zur Biologie der Fransenfledermäuse (*Myotis nattereri* KUHL, 1818). - *Z. f. Säugetierkunde* **38**:1-14.
- LAUFENS, G. (1973): Einfluß der Außentemperatur auf die Aktivitätsperiodik der Fransen- und Bechsteinfledermäuse (*Myotis nattereri*, KUHL 1818 und *Myotis bechsteini*, LEISLER

- 1818). - Period. biol. **75**:145-152, 1973.
- LAUMANN, M. (1986/87): Über Eis- und Mülsteinhöhlen in der Eifel. - Karst und Höhle **1986/87**:97-102; München.
- LAUMANN, M. (Hrsg.) (1997): Höhlenforschung in der Eifel.- 111 S; Gelsenkirchen/Schwelm.
- LAUMANN, M. & K. FROHN (1986/87): Die Höhlen der Eifel. - Karst und Höhle **1986/87**: 29-90; München.
- LAUMANN, M. & M. VETTEN (1988): Felsüberwinternde Fledermäuse 1987/88 im nordrheinwestfälischen Anteil der Eifel. - Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforsch. **34**(2):50.
- LAUTERBORN, R. (1917): Die geographische und biologische Gliederung des Rheinstromes. II. Teil. - Sitzungsber. Heidelberger Akad. Wiss. 1917.
- LENGERSDORF, F. (1951): Naturkundlicher Streifzug durch die Höhlen der Eifel. - Die Eifel **46**(11):162-163; Bonn.
- LENZ, L. & H. SCHAUSTEN (1983): Fledermaus-Winterquartiere im Raum Mosel-Eifel-Hunsrück (Mam., Chiroptera). - Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz **2**(4):598-601; Landau.
- LENZ, L. & H. SCHAUSTEN (1985): Erfassung der in Stollen überwinternden Fledermäuse im Raum Mosel-Eifel-Hunsrück in den Wintern 1983/84 und 1984/85. - Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz **6**:184-190; Landau.
- MESCHÉDE, A. & K.-G. HELLER (2000): Ökologie und Schutz von Fledermäusen in Wäldern unter besonderer Berücksichtigung wandernder Arten (Teil I des Abschlussberichtes zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben „Untersuchungen und Empfehlungen zur Erhaltung der Fledermäuse in Wäldern“.- Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz **66**, 373 S.; Bonn-Bad Godesberg.
- MEYER, E. (1971): Ökologische Beobachtungen in einem Fledermauswinterquartier der Eifel. - Decheniana-Beiheft **18**:115-120; Bonn.
- MÜHR (1866): Die Fauna der näheren Umgegend von Bingen.- Programm der Realschule zu Bingen.
- NATURHISTORISCHES MUSEUM MAINZ (1982): Große Hufeisennase (*Rhinolophus ferrum-equinum*). - Naturhistorisches Mus. Mainz, Nov. 1982, 4 S.
- NIEHUIS, M. (1979): (Chiroptera: Rhinolophidae) - Große Hufeisennase (*Rhinolophus ferrumequinum*) Nachweise in der Nordpfalz und im Nahetal. - Pfälzer Heimat **30**:42-43; Speyer.
- NIEHUIS, M. (1981): (Chiroptera: Vespertilionidae) - *Myotis nattereri* (KÜHL, 1818)- Funde in der Nordpfalz und im Nahetal. - Pfälzer Heimat **32** (3):121,1981; Speyer.
- NIETHAMMER, J. (1961): Verzeichnis der Säugetiere des mittleren Westdeutschlands. - Decheniana **114** (1):75-98; Bonn.
- NOLL, F.C. (1871): Eine Jagd auf Rheinfels.- Der Zoologische Garten **12**: 142-145; Frankfurt a.M.
- OBERHOLZ, A. (1987): Das grüne Mahnmal. - Natur **8/87**:88-93.
- PAULUS, J. (1994): Untersuchung zum Verhalten und zur Verbreitung heimischer Fledermäuse. - Facharbeit am St. Matthias Gymnasium Gerolstein, 37 S.
- PETERS, G. (1992): Imagepflege für Fledermäuse - ein Experiment im Deutschunterricht. - Dendrocopos **19**: 5-14; Trier.
- PETRY, L. (1929): Nassauisches Tier- und Pflanzenleben im Wandel von 100 Jahren.- Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde **80** (2): 197-237; München, Wiesbaden.
- PETRY, W. (1932/33): Besonderheiten der Tierwelt des Nahegebietes. - Sitzungsber. Naturhist. Ver. preuß. Rheinlande Westfalens 1932/33, Abt. D, 12-15.
- PIR, J. (1993): Ein grenzüberschreitendes Fledermausschutzprojekt in Westeuropa. - Z. Säugetierkunde, Sonderheft **58**:50.
- PIR, J. (1993): First results of the supra-national monitoring program of five threatened bat species in western Europe. Association pour la Protection Transfrontalière des Chauves-Souris. - 6.Eur.Bat Res. Symp., Prog.Abstr.,List of Part.: 40.
- PÖRSCHMANN, M. (1989): Möglichkeiten zum Schutz eines Wochenstubenquartieres von Mausohrfledermäusen (*Myotis myotis*) im Zuge der geplanten Umgehung Hönningen (Ahr). - Faunistisches Sondergutachten im Rahmen der UVS, Kocks Consult GmbH, 17 S.
- POHLE, H. (1936): Über die Verbreitung der Hufeisennasen in Deutschland.- Z. Säugetierkunde **11**: 344-349.
- PREUSS, G. (1981): Bemerkungen über Ökosysteme in der Pfalz.- In: GEIGER, G., PREUSS, G. & K.H. ROTHENBERGER (Hrsg.): Pfälzische Landeskunde. Beiträge zu Geographie, Biologie, Volkskunde und Geschichte **2**:9-32; Landau.
- PREUSS, G. (1981): Die Pfalz als Lebensraum für Tiere.- In: GEIGER, G., PREUSS, G. & K.H. ROTHENBERGER (Hrsg.): Pfälzische Landeskunde. Beiträge zu Geographie, Biologie, Volkskunde und Geschichte **2**:47-80; Landau.
- REICHERT, H., RUTHSATZ, B. & M. WEISHAAR (1996): Entwurf zu einem Verbundsystem von noch naturnahen Lebensräumen als Grundlage für die Umsetzung der FFH-Richtlinie im Regierungsbezirk Trier.- Dendrocopos **23**:4-14; Trier-Saarburg.
- REISER, E. (1998): Untersuchungen zum Vorkommen und zur Ökologie von *Myotis emarginatus* (GEOFFROY 1806) im südlichen Pfälzerwald.- Diplomarbeit an der Universität Saarbrücken; 83 S.
- ROER, H. (1962): Erhöhte Jugendmortalität des Mausohrs im Sommerhalbjahr 1961.- Bonn. zool. Beitr. **13** (4):260-273; Bonn.
- ROER, H. (1966): Zur Fledermausfauna der Eifel.- Rheinische Heimatpflege (N.F.) **2**:90-101.
- ROER, H. (1968): Zur Frage der Wochenstuben-Quartiertreue weiblicher Mausohren (*Myotis myotis*). - Bonn. zool. Beitr. **19**:85-96; Bonn.
- ROER, H. (1969): Über Vorkommen und Lebensweise von *Cimex lectularius* und *Cimex pipistrelli* (Heteroptera, Cimicidae) in Fledermausquartieren. - Bonn. zool. Beitr. **4**(20):355-359; Bonn.
- ROER, H. (1969): Zur Ernährungsbiologie von *Plecotus auritus* (L.) (Mam. Chiroptera).- Bonn. zool. Beitr. **4** (20):378-383; Bonn.

- ROER, H. (1970): Probleme der Ernährung und des Jagdverhaltens insektenfressender Fledermäuse. - *Myotis* **8**:3-8; Bonn.
- ROER, H. (1971): Weitere Ergebnisse und Aufgaben der Fledermausberingung in Europa. - *Decheniana*-Beihft **18**:121-144; Bonn.
- ROER, H. (1972): Zur Bestandsentwicklung der Kleinen Hufeisennase (*Chiroptera*, Mam.) im westlichen Mitteleuropa. - *Bonn. zool. Beitr.* **4** (23):325-336; Bonn.
- ROER, H. (1973): Über die Ursachen hoher Jugendmortalität beim Mausohr. - *Bonn. zool. Beitr.* **24**(4):332-341; Bonn.
- ROER, H. (1975): Zur Verbreitung der Fledermäuse im Rheinland von 1945-1974. - *Myotis* **12**:21-43; Bonn.
- ROER, H. (1975): Zur Verbreitung und Ökologie der Großen Bartfledermaus *Myotis brandti* (EVERSMANN, 1845) im mitteleuropäischen Raum. - *Säugetierkundl. Mitt.* **23**(2): 138-143.
- ROER, H. (1977): Zur Populationsentwicklung der Fledermäuse (Mammalia, Chiroptera) in der Bundesrepublik Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Situation im Rheinland. - *Z. Säugetierkunde* **42**:265-278.
- ROER, H. (1977): Über Herbstwanderungen und Zeitpunkt des Aufsuchens der Überwinterungsquartiere beim Abendsegler, *Nyctalus noctula* (SCHREBER, 1774), in Mitteleuropa. - *Säugetierkundl. Mitt.* **25** (3):225-228.
- ROER, H. (1979): Schutz den rheinland-pfälzischen Fledermäusen. - *Beitr. Landespfll. Rheinland-Pfalz* **7**:7-12, Oppenheim.
- ROER, H. (1980/81): Zur Bestandsentwicklung einiger Fledermäuse in Mitteleuropa. - *Myotis* **18/19**:60-67; Bonn.
- ROER, H. (1981): Zur Heimkehrfähigkeit der Zwergfledermaus (*Pipistrellus pipistrellus* SCHREBER, 1774)(Mammalia:Chiroptera). - *Bonn. zool. Beitr.* **32**:13-30; Bonn.
- ROER, H. (1981): Gefährdung und Schutz mitteleuropäischer Wanderfledermäuse. - In: ERZ, W. (Hrsg.) *Schutz von wandernden Tierarten*:57-66. *Naturschutz aktuell*, Nr. 5, Kilda Verlag.
- ROER, H. (1982): Die Fledertiere des Eifeler Landes unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Ahrweiler. - *Jahresbericht 1982 DBV Ahrtal u. Umgebung*:30-35.
- ROER, H. (1982): Zum Herbstzug des Abendseglers (*Nyctalus noctula*) im europäischen Raum. - *Myotis* **20**:53-57; Bonn.
- ROER, H. (1983/84): Zur Bestandssituation von *Rhinolophus ferrumequinum* (SCHREBER, 1774) und *Rhinolophus hipposideros* (BECHSTEIN, 1800) (Chiroptera) im westlichen Mitteleuropa. - *Myotis* **21/22**:122-131; Bonn.
- ROER, H. (1985): Fledermäuse: Ihre Gefährdung und Ultraschallorientierung. - *HB Naturmagazin draußen: Deutsch-Luxemburgischer Naturpark* **41**:40-59.
- ROER, H. (1985/86): The population density of the Mouse-Eared Bat (*Myotis myotis* BORKH.) in North West Europe. - *Myotis* **23/24**:217-222; Bonn.
- ROER, H. (1986): Können mitteleuropäische Mausohren (*Myotis myotis*) bei Umgebungstemperaturen unter dem Gefrierpunkt überwintern ?. - *Dt. Ges. f. Säugetierk.*, 60. Hauptvers., *Kurzf. d. Vorträge u. Posterdemonstrationen*, Paul Parey Verlag.
- ROER, H. (1987): Rheinische Mausohren (*Myotis myotis*) überwintern bei Frosttemperaturen in einem Wochenstubenquartier. - *Myotis* **25**:77-83; Bonn.
- ROER, H. (1988): Beitrag zur Aktivitätsperiodik und zum Quartierwechsel der Mausohrfledermaus *Myotis myotis* (BORKHAUSEN,1797) während der Wochenstubenperiodik. - *Myotis* **26**:97-107; Bonn.
- ROER, H. (1989): Zum Vorkommen und Migrationsverhalten des Kleinen Abendseglers (*Nyctalus leisleri* KUHL, 1818) in Mitteleuropa. - *Myotis* **27**:99-109; Bonn.
- ROER, H. (1989): Rheinische Mausohren (*Myotis myotis*) überwintern bei Frosttemperaturen in einem Wochenstubenquartier. - *Natur u. Umwelt* **3**:22-24.
- ROER, H. (1990): Ethological examinations on the Large mouse-eared bat (*Myotis myotis*) in a nursery colony. - *5. Eur. Bat Res. Symp., Prog.*, Abstr., List of Part.: 7.
- ROER, H. (1990): Hohe Jungensterblichkeit 1990 in einem rheinischen Wochenstubenquartier des Mausohrs (*Myotis myotis*). - *Myotis* **28**:125-130; Bonn.
- ROER, H. (1993): Die Fledermäuse des Rheinlandes 1945-1988. - *Decheniana* **146**:138-183; Bonn.
- ROER, H. (1993): Untersuchungen an einer im Moseltal/Luxemburg ansässigen Kolonie der Großen Hufeisennase (*Rhinolophus ferrumequinum*) mit besonderer Berücksichtigung der Populationsentwicklung seit 1982. - *Z. Säugetierkunde, Sonderheft* **58**:58.
- ROER, U. & H. ROER (1965): Zur Frage der Ruheplatzwahl überwinternder Fledermäuse in Bergwerkstollen. - *Bonner Zool. Beiträge* **16** (1/2):30-32; Bonn.
- LE ROI, O. (1909): Die Säugetiere der Eifel, ein Aufruf zu ihrer Erforschung. - *Eifelvereinsblatt* **10** (2):26-27.
- LE ROI, O. & H. FREIHERR GEYR VON SCHWEPPEBURG (1908): Vorläufiges Verzeichnis der Säugetiere des mittleren Westdeutschlandes. - *Verh. d. naturh. Ver. d. preuß. Rheinlde u. Westfalens* **65**:213-216(ff).
- LE ROI, O. & A. REICHENSBERGER (1913): Die Tierwelt der Eifel in ihren Beziehungen zur Vergangenheit und Gegenwart (Auszug). - *Eifel-Festschrift z. 25 jährigen Jubelfeier des Eifelvereins*, 212 S.
- ROTHKOPF, D. (1970): Eine Analyse von Gewöllen der Schleiereule *Tyto alba* aus der Eifel. - *Bonn. zool. Beitr.* **21**(1/2):63-82; Bonn.
- SANDBERGER, F. (1883): Über eine Lößfauna vom Zollhaus bei Hahnstätten unweit von Diez. - *Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie* **2**: 182-183; Stuttgart.
- SANDBERGER, G. (1857): Vergleichender Beitrag zur Fauna der warmblütigen Wirbelthiere des Mittelrheins. (Die Säugethiere und Vögel des Herzogthum Nassau).- *Verh. naturhist. Ver. preuss. Rheinlande und Westphalens* **14** (= N.F. 4): 69-106; Bonn.
- SANDER, U. (1989): Artenschutzprojekt Fledermäuse in Rheinland-Pfalz: Ur-

- bane Lebensräume und ihre Bedeutung für die Fledermausfauna. - Unveröffentl. Bericht für das LfUG Oppenheim, 55 S.
- SANDER, U. (1990): Artenschutzprojekt Fledermäuse in Rheinland-Pfalz: Urbane Lebensräume und ihre Bedeutung für die Fledermausfauna. - Unveröffentl. Bericht für das LfUG Oppenheim, 54 S.
- SANDER, U. (1992): Faunistisches Sondergutachten zur UVP B 256 Umgehung Rengsdorf. Teil II Ergänzende Untersuchungen: Sommernachweise. - Unveröffentl. Gutachten im Auftrag des Instituts für Planungsdaten, Offenbach, Bonn, 11 S.
- SANDER, U. (1993): Faunistisches Sondergutachten zur UVP B 256 Umgehung Rengsdorf. Teil III Trassenbezogene Aussagen und Maßnahmenkatalog. - Unveröffentl. Gutachten im Auftrag des Instituts für Planungsdaten, Offenbach, Bonn, 8 S.
- SANDER, U. (1996): Die Bedeutung urbaner Lebensräume für Fledermäuse und deren Erfassung unter Einbeziehung der Öffentlichkeit – dargestellt am Beispiel der Stadt Neuwied/Rhein.- In: KIEFER, A. & M. VEITH (Hrsg.): Beiträge zum Fledermausschutz in Rheinland-Pfalz. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **21**: 145-168; Landau.
- SCHÄFER, M. (1844): Moselfauna, die Aufzählung und Beschreibung der im Regierungsbezirk Trier beobachteten Thiere. – Trier
- SCHMAUS, M. (1960): Fledermausberingung im Hunsrück. - Bonn. zool. Beitr., Sonderheft **11**:198-203; Bonn.
- SCHMAUS, R. (1979): Fledermäuse auf dem Hunsrück. - Hunsrücker Heimatblätter **19**:201-203; Simmern.
- SCHMIDT, R. (1990): Ausbau eines klimatisch ungünstigen Westwallstollens als Fledermausquartier. - Dendrocopos **17**:37-40; Bonn.
- SCHNEIDER, J.-F., GRIMM, F., DUCHAMP, L. & L. SEILER (1999): Les chauves-souris dans la Réserve de Biosphère transfrontalière Vosges du Nord—Pfälzerwald.– Annales scientifiques de la Réserve de Biosphère des Vosges du Nord **7**: 145-160; La Petite-Pierre.
- SCHNELL, R. (1975): Rückgang der Fledermäuse im weiteren Rhein--
- Main-Gebiet. - Staatsexamensarbeit, Univ. Frankfurt.
- SCHORR, K. (1996): Erstnachweis der hochrufenden Zwergfledermaus (*Pipistrellus pipistrellus* SCHREBER, 1774) in Rheinland-Pfalz.- In: KIEFER, A. & M. VEITH (Hrsg.): Beiträge zum Fledermausschutz in Rheinland-Pfalz. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **21**: 45-50; Landau.
- SCHORR, K. (1999): Bemerkenswerte Detektornachweise von Fledermäusen (Mammalia: Chiroptera) im Landkreis Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz).- Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz **9**(1):161-170; Landau
- SCHORR, K. (2000): Vier weitere Detektornachweise der Nordfledermaus (*Eptesicus nilssonii* KEYSERLING & BLASIUS, 1839) im Raum Rheinhessen-Pfalz (Rheinland-Pfalz).- Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz **9**(2): 711-715; Landau
- SCHREIBER, C. (1993): Artenschutzprojekt Fledermäuse: Fledermausvorkommen in Kirchengebäuden. - Unveröffentl. Bericht an das LfUG Oppenheim, 24 S. + 33 S. Anhang.
- SCHRÖDER, S. (1994): Untersuchungen zweier Verkehrswege hinsichtlich der Mortalitätsrate von Wirbeltieren unter besonderer Berücksichtigung der vorhandenen Biotopen. - Fauna Flora Rheinland-Pfalz **7** (2):433-461; Landau.
- SCHUSTER, W. (1906): Repetitio et Correctio des Zoologischen Teils: „Die Tierwelt“ von W. MEDICUS in „Landes- und Volkskunde der Bayerischen Rheinpfalz 1867“. - Mitteilungen der Pollichia **22**: 12-17; Bad Dürkheim.
- SEFRIN, E. (1993): Größere Anzahl von Hirschkäfern (*Lucanus cervus*) als Beute von Fledermäusen (Mammalia:Chiroptera). - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz **7** (1):200-202; Landau.
- SEILER, L. & F. GRIMM (1995): In Burgruinen und Felsspalten der Pfalz (Rheinland-Pfalz, BRD) überwinterte Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera). - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz **8**(1):43-52; Landau.
- SKIBA, R. (1989): Erstnachweis der Nordfledermaus, *Eptesicus nilssonii* (KEYSERLING U. BLASIUS, 1839), in der Eifel. - Jber. naturwiss. Ver. Wuppertal **42**:7-9.
- SKIBA, R. (1989): Die Verbreitung der Nordfledermaus, *Eptesicus nilssonii* (KEYSERLING U. BLASIUS, 1839), in der Bundesrepublik Deutschland und der deutschen demokratischen Republik.- Myotis **27**: 81-98; Bonn.
- SPRATER, W. (1898): Pflanzen- und tierphänologische Beobachtungen aus der nächsten Umgebung von Neustadt an der Haardt 1893, 1895, 1897 und 1898.- Mitteilungen der Pollichia **61**(12): 87-92; Bad Dürkheim.
- SOUND, P. (1994): Zur aktuellen Verbreitung der Zweifarbfledermaus *Vespertilio discolor* (NATTERER, 1818) in Rheinland-Pfalz (BRD). - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz **7**(3): 709-717; Landau.
- VEITH, M. (1985): Fledermauserfassung im Hunsrück Winter 1983-1984. - Ornith. Naturschutz **6**:197; Landau.
- VEITH, M. (1987): Vorkommen und Status der Nordfledermaus (*Eptesicus nilssonii* KEYSERLING U. BLASIUS, 1839). - Natursch. u. Ornith. Rheinland-Pfalz **4**(4):885-896; Landau.
- VEITH, M. (1987): Artenschutzprojekt Fledermäuse (Chiroptera) in Boppard. - Unveröffentl. Gutachten für die Stadt Boppard.
- VEITH, M. (1988): Felsüberwinternde Fledermäuse (Mammalia, Chiroptera) im Regierungsbezirk Koblenz (BRD, Rheinland-Pfalz) faunistische Analyse einer regionalen Chiropterenzönose. - Fauna Flora Rheinland-Pfalz **5**:44-91; Bonn.
- VEITH, M. (1988): Artenschutzprojekt Fledermäuse (Chiroptera) in Rheinland-Pfalz. - Unveröffentl. Bericht für das LfUG Oppenheim, 185 S. + 209 S. Anhang.
- VEITH, M. (1992): Saisonale Bestandschwankungen der Fledermauspopulationen in unterirdischen Quartieren. - Fauna Flora Rheinland-Pfalz **6**: 961-979; Landau.
- VEITH, M. (1996): Qualitative und quantitative Veränderungen einer Lebensgemeinschaft überwinternder Fledermäuse (Mammalia, Chiroptera) – Ergebnisse von sechs Jahrzehnten Erfassung.- In: KIEFER, A. & M. VEITH (Hrsg.): Beiträge zum Fledermausschutz in Rheinland-Pfalz. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **21**: 95-106; Landau.

- VEITH, M., KIEFER, A. & K. ZIMMERMANN (1991): Schutz unterirdischer Fledermausquartiere Argumente und Methoden. - Fauna Flora Rheinland-Pfalz **6**(2):553-569; Landau.
- WAGNER, G. (1999): Fledermauschutz im Rhein-Hunsrück-Kreis. - Rhein-Hunsrück-Kalender **55**: 167-171; Simmern.
- WAGNER, G. (1999): Fledermauschutz im Hunsrück. - Jahreshft 1999 des Hunsrückvereins: 61-65.
- WEBER, D. (1984): Die Höhlenfauna und -flora des Katastergebietes Rheinland-Pfalz/Saarland. - Manuskript (unveröffentlicht): 73 S.
- WEBER, D. (1987): Jahresbericht des Arbeitskreises Pfalz der Höhlenforscherguppe Karlsruhe 1986. - Pfälzer Heimat **38**(2):88-89.
- WEBER, D. (1987): *Myotis myotis* BORKHAUSEN: Ende April in Winterruhe. - Pfälzer Heimat **38**(2):80; Speyer.
- WEBER, D. (1988): Die Höhlenfauna und -flora des Höhlenkatastergebietes Rheinland-Pfalz/Saarland. - Abhandl. z. Karst- u. Höhlenkunde **22**, 157 S.
- WEBER, D. (1989): Die Höhlenfauna und -flora des Höhlenkatastergebietes Rheinland-Pfalz/Saarland, 2. Teil. - Abhandl. z. Karst- u. Höhlenkunde **23**, 250 S.
- WEBER, D. (1989): Fledermausbestandsentwicklung in einem neu entdeckten Bergwerk in der Südpfalz. - Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforsch. **35**:110.
- WEBER, D. (1995): Die Höhlenfauna und -flora des Höhlenkatastergebietes Rheinland-Pfalz/Saarland, 3. Teil. - Abhandl. z. Karst- u. Höhlenkunde **29**, 322 S.
- WEISHAAR, M. (1984): Ergebnisse der Fledermaus-Winterkontrollen 1983/84 in Felsstollen im Regierungsbezirk Trier. - Dendrocopos **11**:59-63; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1985): Ergebnisse der Fledermaus-Winterkontrollen 84/85 in Felsstollen im Regierungsbezirk Trier. - Dendrocopos **12**:1-6; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1985): Erste Ergebnisse der Rückstandsanalysen von chlorierten Kohlenwasserstoffen in Fledermäusen aus dem Regierungsbezirk Trier und den angrenzenden Gebieten. - Dendrocopos **12**:7-8; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1985): Erste Ergebnisse der Rückstandsanalysen von chlorierten Kohlenwasserstoffen in
- WEISHAAR, M. (1985): Fledermauschutz. - Naturschutz in Rheinland-Pfalz **1**(4):8-9.
- WEISHAAR, M. (1986): Ergebnisse der Fledermauswinterkontrollen 85/86 in Felsstollen im Regierungsbezirk Trier. - Dendrocopos **13**:12-17; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1986): Mögliche Einflußgrößen für felsbewohnende Fledermäuse auf die Wahl ihrer Winterquartiere. Eine Untersuchung aus dem Regierungsbezirk Trier. - Dendrocopos **13**:18-22; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1986): Fledermäuse. - Naturschutz in Rheinland-Pfalz **2**(6):4-6.
- WEISHAAR, M. (1986): Vorläufige Ergebnisse der Fledermaussommerkartierungen im Regierungsbezirk Trier. - Dendrocopos **13**:1-11; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1987): Die Giftbelastung der Fledermäuse. - Dendrocopos **14**:29-33; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1987): Ergebnisse der Fledermaus-Winterkontrollen 86/87 in Felsstollen im Regierungsbezirk Trier. - Dendrocopos **14**:18-28; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1987): Weitere Ergebnisse der Fledermaus-Sommerkartierungen im Regierungsbezirk Trier. - Dendrocopos **14**:9-14; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1988): Überlegungen und Erfahrungen zum fledermausgerechten Verschluß von Winterquartieren. - Dendrocopos **15**:25-28; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1988): Weitere Ergebnisse der Fledermaus-Sommerkartierungen (Stand: Herbst 1987) im Regierungsbezirk Trier. - Dendrocopos **15**:2-8; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1989): Fortpflanzungsnachweis der Nordfledermaus (*Eptesicus nilssoni*, KEYSERLING UND BLASIUS 1839) in Rheinland-Pfalz. - Dendrocopos **16**:3-4; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1989): Ergebnisse der Fledermaus-Winterkontrollen 1988/89 in Felsstollen im Regierungsbezirk Trier. - Dendrocopos **16**:33-38; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1989): Artenschutzprojekt Fledermäuse Rheinland-Pfalz: Große Hufeisennase (*Rhinolophus ferrumequinum*) im Regierungsbezirk Trier. - Unveröffentl. Bericht für das LfUG Oppenheim: 34 S.
- WEISHAAR, M. (1989): Weitere Ergebnisse der Fledermaus-Sommerkartierungen (Stand: Herbst 1988) im Regierungsbezirk Trier. - Dendrocopos **16**:25-32; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1990): Sommernachweise von *Myotis dasycneme* in der Eifel. - Dendrocopos **17**:15-17; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1990): Ergebnisse der Fledermaus-Winterkontrollen 1989/90 in Felsstollen im Regierungsbezirk Trier. - Dendrocopos **17**:21-27; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1991): Ergebnisse der Fledermauswinterkontrollen 1990/91 im Regierungsbezirk Trier. - Dendrocopos **18**: 9-22; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1991): Weitere Ergebnisse der Fledermaus-Sommerkartierungen (Stand: Herbst 1990) im Regierungsbezirk Trier. - Dendrocopos **18**: 23-44; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1992): Artenschutzprojekt Fledermäuse (Chiroptera) in Rheinland-Pfalz: - Unveröffentl. Bericht für das LfUG, Oppenheim: 164 S. + 13 S. Anhang.
- WEISHAAR, M. (1992): Ergebnisse der Fledermauswinterkontrollen 1991/92 im Regierungsbezirk Trier. - Dendrocopos **19**:3-4; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1992): Landschaftsbewertung anhand von Fledermausvorkommen. - Dendrocopos **19**:19-25; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1992): Landschaftsstrukturen, unersetzliche Elemente im Fledermausschutz. - Dendrocopos **19**: 15-18; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1992): Zur Frage nach dem Eintritt der Geschlechtsreife bei

- mitteleuropäischen Fledermäusen. - *Nyctalus* (N.F.) **4**(3):312-314; Berlin.
- WEISHAAR, M. (1993): Ergebnisse der Fledermauswinterkontrollen 1992/93 im Regierungsbezirk Trier. - *Dendrocopos* **20**:6-7; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1993): Verbreitungsbestimmende Faktoren für Fledermäuse. - *Dendrocopos* **20**:8-36; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1994): Ergebnisse der Fledermauswinterkontrollen 1993/94 im Regierungsbezirk Trier. - *Dendrocopos* **21**: 15-16; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1995): Effizienz verschiedener Untersuchungsmethoden für die Nachweisbarkeit von Fledermausarten. - *Dendrocopos* **22**: 3-9; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1995): Ergebnisse der Fledermauswinterkontrollen 1994/95 im Regierungsbezirk Trier. - *Dendrocopos* **22**: 10-11; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1996): Ergebnisse der Fledermauswinterkontrollen 1995/96 im Regierungsbezirk Trier. - *Dendrocopos* **23**: 23-24; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1996): Status der Bechsteinfledermaus (*Myotis bechsteini*) im Westen von Rheinland-Pfalz. - *Nyctalus* (N.F.) **6**(2) : 121-128.
- WEISHAAR, M. (1997) : Große Hufeisennase (*Rhinolophus ferrumequinum*) in Rheinland-Pfalz. - In: ARBEITSKREIS FLEDERMÄUSE SACHSEN-ANHALT E.V. (Hrsg.): Tagungsband „Zur Situation der Hufeisennasen in Europa“: 165-168.
- WEISHAAR, M. (1997): Ergebnisse der Fledermauswinterkontrollen 1996/97 im Regierungsbezirk Trier. - *Dendrocopos* **24**: 3-4; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1997): Bemerkungen zur zeitlichen Nachweisbarkeit einiger Fledermausarten in Winterquartieren. - *Dendrocopos* **24**: 180-186; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1998): Ergebnisse der Fledermauswinterkontrollen 1997/98 im Regierungsbezirk Trier. - *Dendrocopos* **25**(2): 75-76; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. (1998): Die Fledermausvorkommen in der Region Trier. - *Dendrocopos* **25**(2): 77-100; Trier-Saarburg.
- WEISHAAR, M. & M. VEITH (1987): Erstnachweis der Großen Bartfledermaus (*Myotis brandti*, EVERSMANN, 1845) in Rheinland-Pfalz. - *Dendrocopos* **14**:1-8; Trier-Saarburg.
- WISSING, H. (1981): Zur Situation der Fledermäuse in der Pfalz. - *Wir und die Vögel* **13**(6): Beilage zw. S. 16 u. 17; Kornwestheim.
- WISSING, H. (1985): Fledermausschutz. - *Naturschutz in Rheinland-Pfalz* **1**(1):51-53; Landau.
- WISSING, H. (1985): Wanderfalke (*Falco peregrinus*) schlägt Abendsegler (*Nyctalus noctula*). - *Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz* **4**(1): 192-193; Landau.
- WISSING, H. (1986): Die Fledermäuse der Pfalz - ein Überblick. - *Pollichia-Kurier* **2**(1):120.
- WISSING, H. (1986/87): In der Pfalz in Höhlen, Stollen und Felsspalten überwinternde Fledermausarten. - *Karst und Höhle* **1986/87**: 137-140; München.
- WISSING, H. (1989): Artenschutzprojekt Fledermäuse Rheinland-Pfalz: Wimperfledermaus im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz. - *Unveröffentlicht. Bericht für das LFUG Oppenheim*, 15 S.
- WISSING, H. (1990): Massenansammlungen des Abendseglers (*Nyctalus noctula*) über einem Truppenübungs-gelände bei Landau/Pfalz. - *Dendrocopos* **17**:18-20; Trier-Saarburg.
- WISSING, H. (1993): Fledermauserfassungen im Sommer 1992 und Winter 1992/93 in der Pfalz. - *Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz* **7**(1): 220-223; Landau.
- WISSING, H. (1993): Fledermauswinterkontrolle. - *Pollichia Kurier* **9**(2): 68; Bad Dürkheim.
- WISSING, H. (1993): Heimliche Untermieter. - *Jahresbericht 1992 der Lehr- und Versuchsanstalt für Viehzüchtung Neumühle*: 62-63; Münchweiler a.d. Alsenz.
- WISSING, H. (1996): Interspezifische Vergesellschaftung von Fledermäusen in künstlichen Nisthöhlen in der Pfalz. - In: KIEFER, A. & M. VEITH (Hrsg.): Beiträge zum Fledermausschutz in Rheinland-Pfalz. *Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz*, Beiheft **21**: 107-110; Landau.
- WISSING, H. (1996): Winterquartiere des Großen Abendseglers (*Nyctalus noctula* SCHREBER, 1774) in der Pfalz (Rheinland-Pfalz, BRD). - In: KIEFER, A. & M. VEITH (Hrsg.): Beiträge zum Fledermausschutz in Rheinland-Pfalz. *Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz*, Beiheft **21**: 111-118; Landau.
- WISSING, H. & H. KÖNIG (1994): Ergebnisse der Fledermauserfassung in Nistkästen und Winterquartieren der Pfalz (Mammalia: Chiroptera). - *Sommer 1993 und Winter 1993/94. - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz* **7**(3): 719-732; Landau.
- WISSING, H. & H. KÖNIG (1995): Ergebnisse der Fledermauserfassung in Nistkästen und Winterquartieren der Pfalz (Mammalia: Chiroptera). - *Sommer 1994 und Winter 1994/95. - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz* **8**(1): 65-78; Landau.
- WISSING, H. & H. KÖNIG (1996): Wiederfund der Zweifarbfledermaus (*Vespertilio discolor* NATTERER, 1818) in der Pfalz – nach 130 Jahren. - In: KIEFER, A. & M. VEITH (Hrsg.): Beiträge zum Fledermausschutz in Rheinland-Pfalz. *Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz*, Beiheft **21**: 51-56; Landau.
- WISSING, H. & H. KÖNIG (1996): Zur Verbreitung felsüberwinternder Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz (Rheinland-Pfalz) – Winter 1987/88 bis 1884/95. - In: KIEFER, A. & M. VEITH (Hrsg.): Beiträge zum Fledermausschutz in Rheinland-Pfalz. *Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz*, Beiheft **21**: 57-76; Landau.
- WISSING, H. & H. KÖNIG (1999): Drei weitere Funde der Zweifarbfledermaus (*Vespertilio discolor* NATTERER, 1818) in der Pfalz (Rheinland-Pfalz). - *Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz* **9**(1): 359-363; Landau
- WISSING, H., GRIMM, F., KÖNIG, H. & L. SEILER (1995): Fledermauserfassung in Nistkästen und Winterquartieren der Pfalz (BRD, Rheinland-Pfalz) – Sommer 1995 und Winter 1995/96. - *Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz* **8**: 509-522; Landau.
- WOLF, H. (1937): Die Chiropteren der mittleren Rheinprovinz, Vorkommen u. Lebensweise (Vorläufige Mitteilung). - *Decheniana* **94**:26-29; Bonn.
- WOLF, H. (1961): Über das Vorkommen einiger Fledermausarten in Höhlen.

**IMPESSUM****Redaktion**

René Reifenrath

**Zusammengestellt von**

Astrid Fölling und René Reifenrath  
 Riedweg 28  
 55130 Mainz-Laubenheim  
 Tel.: (06131) 86535  
 Email: rreifenr@mainz-online.de

Andreas Kiefer  
 Frauenlobstr. 93a  
 55118 Mainz  
 Tel.: (06131) 638942  
 Email: kiwi@oekologie.biologie.uni-mainz.de

Manfred Weishaar  
 Im Hainbruch 3  
 54317 Gusterath  
 Tel.: (06588) 95115  
 Fax: (06588) 992080  
 E-Mail: Manfred.Weishaar@t-online.de

len und Stollen des Rheinlandes. - Jahreshefte f. Karst- u. Höhlenkunde **2**:227-235.

ZIMMERMANN, K. (1989): Artenschutzprojekt Fledermäuse (Chiroptera) in Rheinland-Pfalz. - Unveröffentl. Bericht für das LfUG Oppenheim.

ZIMMERMANN, K. (1990): Artenschutzprojekt Fledermäuse (Chiroptera) in Rheinland-Pfalz. - Unveröffentl. Bericht für das LfUG Oppenheim, 109 S.

ZIMMERMANN, K. (1989): Artenschutzprojekt Fledermäuse Rheinland-Pfalz: Bedeutung unterschiedlicher Waldtypen für Fledermäuse. - Unveröffentl. Bericht für das LfUG Oppenheim, 11 S.

ZIMMERMANN, K. (1990): Artenschutzprojekt Fledermäuse Rheinland-Pfalz: Bedeutung unterschiedlicher Waldtypen für Fledermäuse. - Unveröffentl. Bericht für das LfUG Oppenheim, 49 S.

ZIMMERMANN, K. (1992): Artenschutzprojekt Fledermäuse (Chiroptera) in Rheinland-Pfalz (Fortführung): Schwerpunktprogramm (1.2): Bedeutung unterschiedlicher Waldtypen für Fledermäuse.- Unveröffentl. Bericht für das LfUG Oppenheim, 116 S.

ZIMMERMANN, K. (1992): Artenschutzprojekt Fledermäuse (Chiroptera) in Rheinland-Pfalz: Richtlinien der Baumchirurgie, Baumsanierung und Baumpflege unter Realisation des Fledermausschutzes bzw. Naturschutzgesetzes. 1. Entwurf einer zusätzlichen ökologischen Verordnung (ZÖV)-Baum. - Unveröffentl. Bericht für das LfUG Oppenheim, 36 S.

ZIMMERMANN, K. (1992): Bäume verstehen, Bäume pflegen. - Gemeinde und Stadt **10**:265-266.

ZIMMERMANN, K. (1993): Untersuchungen von Bäumen im Bereich der Stadt Koblenz auf ihre Eignung als Fledermaus-Quartiere. Abschlußbericht Phase I: Methodenvergleich. - Unveröffentl. Gutachten für die GNOR, Nassau, im Auftrag der Stadt Koblenz.

ZIMMERMANN, K. (1993): Untersuchungen von Bäumen im Bereich der Stadt Koblenz auf ihre Eignung als Fledermaus-Quartiere. Abschlußbericht Phase II und Beginn Phase III: Vorauswahl und Erfassung. - Unveröffentl. Gutachten für die GNOR, Nassau, im Auftrag der Stadt Koblenz. 5 S. + 12 S. Anhang.

ZIMMERMANN, K. & M. VEITH (1989): Beobachtungen felsspaltenüberwinternder Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) und ihre Bedeutung für die quantitative Fledermaus-Wintererfassung. - Fauna Flora Rheinland-Pfalz **5**:707-717; Landau.

**Arbeitskreis  
 Fledermausschutz  
 Rheinland-Pfalz**

